

# INSTRUCCIONES PARA TEST DE GRAHAM

## Materiales necesarios:

- Gasas
- Frasco con formol al 5%

El formol es tóxico por lo que se debe mantener fuera del alcance de los niños, no debe ser tocado ni ingerido.

## Precauciones al momento de la toma de muestra:

- No se deben utilizar talcos ni pomadas.
- Evitar defecar previo a la toma de muestra.
- Evitar contaminar las gasas con materia fecal.
- Previo al análisis no debe higienizarse la zona.

## Procedimiento:

A la mañana, al levantarse, antes de ir al baño y/o higienizarse, tome una gasa humedecida con agua corriente y pásela por la zona anal. Una vez finalizada la operación, colocar la gasa dentro del frasco de formol. Este procedimiento debe realizarse durante 6 días consecutivos utilizando cada día una gasa nueva y todas las gasas deben colocarse dentro del mismo frasco con formol. El frasco debe mantenerse a temperatura ambiente. Concluida la recolección de 6 días consecutivos, remitir la muestra al Laboratorio, asegurándose que el frasco quede correctamente cerrado.

Es **IMPORTANTE** presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.

LABORATORIO CENTRAL



**Fleni** Neurología  
Neurocirugía  
Rehabilitación

**60** AÑOS